



## INSTRUÇÕES

### MIOTOMIA ENDOSCÓPICA PERORAL

#### - PRÉ-OPERATÓRIAS:

- Proibido o uso de Omeprazol pelo período de 5 dias antes da cirurgia;
- Não suspender medicamentos controlados ou para doenças crônicas, se tiver fazendo uso de anticoagulantes, comunicar ao cardiologista e prosseguir com o risco cirúrgico até a liberação total para cirurgia.
  - Se alimentar até às 18 hrs do dia anterior, evitando derivados do leite;
  - Está liberada a ingestão de água e água de coco até às 06h00 da data do procedimento;
  - Vestimenta na realização do procedimento (Calcinha ou Cueca devem ser de algodão, sem porcentagem de Lycra ou elastano);
  - Exames;
  - Risco cirúrgico carimbado e assinado pelo cardiologista;
  - O paciente será reavaliado um dia antes do procedimento pelo cirurgião e anestesista. E a cirurgia poderá a qualquer tempo ser contra indicada mediante avaliação;

#### -PÓS-OPERATÓRIAS:

##### Após ordens médicas:

- Manter-se em repouso absoluto nas primeiras horas;
- Fazer caminhadas para uma recuperação mais rápida;
- Seguir a prescrição de medicamentos caso indicado;
- Ingestão de sólidos e líquidos mediante autorização médica:
  1. Primeiro dia após a cirurgia ingestão de líquidos;
  2. Segundo dia após a cirurgia ingestão de alimentos pastosos;
  3. Terceiro dia após a cirurgia ingestão de alimentos sólidos;
- Em caso de dores, febre ou quaisquer outros sintomas que cause desconforto emergencial, informar o setor de enfermagem ou contatar a equipe cirúrgica.